



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും  
(പ്രാബല്യം: 23.11.2024 മുതൽ 27.11.2024 വരെ)



കോഴിക്കോട്‌ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻസ്: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. - 94/2024

തീയതി: 22/11/2024

എ.പിനിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
00	34.5 – 35.1	25.7 – 27.5	64 – 89	00 - 00

ബി.വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	23-11-2024	24-11-2024	25-11-2024	26-11-2024	27-11-2024
മഴ, മി.മീ	0.1	0.1	0.1	0.1	8
കുടിയതാപനില, °C	35	35	35	35	35
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	26	26	26	26	26
കുടിയആപേക്ഷികആർഭത, %	78	78	78	78	78
കുറഞ്ഞആപേക്ഷികആർഭത, %	68	68	68	68	68
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	2	2	2	2	3
കാറിന്റെവീഡിൾ, ഡിഗ്രി	320	290	320	290	320
മേഖലാവിന്യാസം, കെട്ട	2	2	3	2	3

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
നേരിയ മഴ **			
ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. പകർസമയങ്ങളിൽ കുടിയ ഉംഖ്ചാവും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപ നിലിയും അനുഭവപ്പെടും.			നവംബർ 22 മുതൽ 26 വരെ നേരിയ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 2.5 മില്ലിമുതൽ 15.5 മില്ലി വരെ).

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>പാകമായ വിളകൾ വിളവെടുക്കുകയും, വേഗത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുക. വിളവെടുത്ത വിളകൾ വയലിലോ തുറസ്സായ സമ്പദങ്ങളിലോ കുന്നാരമാക്കിയിടരുത്.</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവാഡി, മണംസൾ, കൊപ്പ ഇല്ലാഞ്ചെർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ബെയിലത്തിനുണ്ടാകുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചകരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഭ്ഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വള്ള, വിത്ത്, കാല്പിത്തിറകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ തട്ടാത്തത്തും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കൊടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുൻചുമാറി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>കീടനാശിനി പശ ചേർത്തു തളിക്കുക.</p>		
<p>നെല്ല്</p>	<p>രണ്ടാം വിള പരിച്ഛു നടുന്ന ഘട്ടം</p>	<p>ഞാർ പരിച്ഛു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്നേ വേർ പ്രസ്തുതേയാമോണാസ് ലായൻ) 20 ഗ്രാം പ്രസ്തുതേയാമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ(എ അര മൺകളും മുക്കി വെക്കുക. ഇത് നെല്ല് കരുതേതാട വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.</p> <p>മുയില്ലാത്ത നേരത്തു വെള്ളം താഴ്ത്തി, പാടവരമിലെ ജല നിർഗമന നാളികൾ അടച്ചതിനു ശേഷം, വള്ളം ചെയ്യുക.</p> <p>പരിച്ഛുനടുന്ന സമയത്ത് മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെന്റ് 400 ഗ്രാം യും, 900 ഗ്രാം മസുറിഫോണ്, 150 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം ഹസ്കാലമുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെന്റ് 400 ഗ്രാം യും, 700 ഗ്രാം മസുറിഫോണ്, 120 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.</p>	
<p>പച്ചകരികൾ</p>	<p>തെക്കകൾ</p>	<p>മണ്ണിൽ, സെന്റ് നന്നിന് നാല് കിലോ വീതം കുമ്മായം വിതരുക. കുടാതെ ടൈറ്റിക്കോഡൈർ സന്പുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകമോ കുന്നോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ വാട്ട് രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p> <p>പരിച്ഛു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്നേ വേർ പ്രസ്തുതേയാമോണാസ് ലായൻ (20 മില്ലി. പ്രസ്തുതേയാമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ)-എ അര മൺകളും മുക്കി വെക്കുക. നേരിട്ട് വിത്ത് നടുതാണെങ്കിൽ തെക്കകൾക്ക് ലായൻ ഇലകളിൽ തളിക്കുക. ഇത് തെക്കകൾ കരുതേതാട വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.</p>	
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>കുന്നു ചീയൽ</p> 	<p>കുന്നുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിക്കാട്ടി നശിപ്പിക്കുകയും മുൻകളിൽ ബോഡേയാ കുഴപ്പു പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുന്നിനെ ഒരു ജ്വാസ്സിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരഞ്ഞാതെ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതേതാലുക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലെക്കവിളുകളിലും ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോഡേയാ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p> <p>ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ഇല/പുക്കുല കരിച്ചൽ 	1% ബോദ്ധോ മിശ്രിതമോ 0.03% കോപർ ഓൾ ഷ്രോറേറോഡോ തളിക്കുക. കൃടാതെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗത്തിന് പറഞ്ഞ പ്രതിവിധികൾ നിർബന്ധമായും അവലംബിക്കുക.
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	പീച്ചൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ദൈനങ്കോഡൽ സമ്പൂഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്കച്ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോദ്ധോ ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മഴ്ന്ന് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ പീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേന്തൻ വാഴ)	ഇലതീനി പുഴു 	രജൈവ കീടനാശിനികളായ ശ്രേയ, നന്ന തുടങ്ങിയാൽ 10 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലകളുടെ രണ്ടുവശത്തുമായി തളിക്കണം. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽമാത്രം: കീനാൽഫോസ് 20 ഇസി (2-4 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക. അമൈസ്റ്റിൽ എൻവെൺഡിയമെബി 39.35 SC (2 മില്ലി, 10 ലിറ്റർ വെള്ളം) തളിക്കുക.
കശുമാവ്	തളിരിടുന്ന ഘട്ടം	തേയില കൊതുക് 	ആക്രമണം കണ്ടാൽ മാത്രം നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക (പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട മലിനത പീലുകളിൽ ചുരുഞ്ഞിയ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം). ആക്രമണം ശരഖയിൽപ്പെട്ടാൽ ലാംഡ സൈഹാലോത്രിൻ + കോപർ ഓൾ ഷ്രോറേറോഡോ തളിക്കുക. (@ ലാംഡ സൈഹാലോത്രിൻ 0.6 മില്ലി + കോപർ ഓൾ ഷ്രോറേറോഡോ 2 (ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക).
കശുമാവ്	പുക്കുന്ന ഘട്ടം (നേരത്തെ കായ്ക്കുന്ന ഇനങ്ങളായ മാടക്കത്തെറ-1, KAU – നിർവ്വാര, ശ്രീ...)	തേയില കൊതുക്	ആക്രമണം കണ്ടാൽ മാത്രം നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക (പാനിക്കിളിൻ: റെ പുക്കുലത്തണ്ടിൽ/തണ്ടിൽ ചുരുഞ്ഞിയ പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം). ആക്രമണം ശരഖയിൽപ്പെട്ടാൽ കീനാൽഫോസ് + മാങ്കാസൈബ് (@കീനാൽഫോസ് 2 മില്ലി + മാങ്കാസൈബ് 2 (ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.

വെണ്ട	വിവിധ ഘട്ടം	തണ്ണുതുരപ്പൻ	കൊറാജൻ 3 മിലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ രോഴ്സ് ഇടവേളയിൽ 2-3 തവണ തണിച്ച് കൊടുക്കുക.
പ്രശ്ന	വിവിധ ഘട്ടം	തെയിലേരിയ രോഗം	<p>തെയിലേരിയ ജനുസ്സിലെ ഹീമോ-ഫ്രോറ്റോസോഡാ പരാനാഡോജികൾ മുലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ടിക്ക് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് തെയിലേരിയോസിസ്.</p> <p>വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സാധാരണ കണ്ണുവരുന്ന ഉള്ളമേഖലാ തെയിലിയിയോസിസിനു കാരണമാകുന്നത് ടി ആനുപദ്ധത്യാണ്.</p> <p>പനി, വീർത്ത ഉപരിപ്പുവമായ ലിംപ് നോസുകൾ എന്നിവയാണ് സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കനുകാലികളുടെ അവന്നു പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടും.</p> <p><b>പ്രതിരോധത്തിനായി:</b> മുഗങ്ങളെ അകാരാസെസയുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേർപ്പെ ചെയ്യുന്നതോ മുകിയോ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി</p>

**ഒപ്പ്/-**  
 നോസൽ ഓഫീസർ  
 ഗ്രാമീണകൃഷികാലാവന്നുസേവപ്പബ്ലിക്

\*\*മഴ അപായ വർഷാ സുചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താകബിൽ (ഉന്നനടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശൈല (കാതോർക്കുക)	നിസ്സാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
--------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------



