



Gramin Krishi Mausam Sewa
 India Meteorological Department
 Kerala Agricultural University
 Vellanikkara, Thrissur, Kerala



Agromet Advisory Bulletin

Date : 02-06-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-06-02(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-06-03	10.0	34.0	24.0	90	70	10.0	270	8
2020-06-04	8.0	33.0	24.0	90	70	8.0	250	8
2020-06-05	8.0	33.0	24.0	90	70	9.0	270	8
2020-06-06	10.0	32.0	24.0	90	70	8.0	270	8
2020-06-07	13.0	31.0	24.0	90	70	10.0	270	8

Weather Summary/Alert:

- Light to moderate rainfall is expected in coming days due to the arrival of monsoon and yhe days will be mostly cloudy.
- കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതിനാൽ നേരിയ മഴ മുതൽ മിതമായ മഴ വരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കൂടാതെ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക.

General Advisory:

- Make proper drainage facilities while preparing the land for planting. Spraying should be done only on dry/clear weather conditions.
- നടീലിനായി കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നീർവാർച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. വരണ്ട അഥവാ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം സ്പ്രേയിങ് ചെയ്യുക.

SMS Advisory:

-
-

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare the land for paddy transplantation. Organic manures should be thoroughly incorporated in the soil. • നെല്ല് പറിച്ച് നടാനായി കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ജൈവ വളങ്ങൾ മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> Apply Magnitium sulphate at 500g/palm/year after 10 days of fertilizer application. വളമിട്ട് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ തെങ്ങുകൾക്കു മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 500 g ഒരു തെങ്ങിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ന തോതിൽ ചുവട്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.
BRINJAL	<ul style="list-style-type: none"> Transplant 25 days old vegetable seedling having 3 to 4 leaves to the main field after dipping the seedlings in pseudomonas solution (20g/L) for half an hour. 25 ദിവസം പ്രായമായതും 3 മുതൽ 4 വരെ ഇലകൾ ഉള്ളതുമായ തൈകൾ അരമണിക്കൂർ സ്യൂഡോമൊണാസ് ലായനിയിൽ (20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) മുക്കി വച്ചതിനു ശേഷം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നടുക.
BANANA	<ul style="list-style-type: none"> Give propping to the banana plants especially for those bunch emerged ones. Cover properly the bunches to avoid the attack of ring spot disease and pitting disease of banana. Spray pseudomonas 20g per litre against zigatoka of banana. If the attack is severe, spray 1ml/L solution of propiconazole. കുല വന്ന വാഴയ്ക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ താങ്ങുകൾ കൊടുക്കുക. വൈറസ് രോഗങ്ങളെയും ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളെയും തടയുന്നതിനായി കുലകൾ നന്നായി പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുക. വാഴയിലെ സിഗടോക്ക രോഗത്തിനെതിരെ 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമൊണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കുക. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 1 ml പ്രൊപികൊണസോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കുക.

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> Clean the cattle shed and its surroundings to avoid the situation of water stagnation around it to make it free from mosquitoes. Cover the cow dung pit properly from direct rainfall. കൊതുകു മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്നത് തടയാൻ തൊഴുത്തും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി വെയ്ക്കാനും, വെള്ളക്കെട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ചാണക കുഴികളിൽ മഴ നേരിട്ട് വീഴാതെ മൂടി വയ്ക്കുക.