



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റ്
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, പാലക്കാട്
ഫോൺ: 0466 2212279 ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
പാലക്കാട് ജില്ല



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റേയും പാലക്കാട് ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്റേയും കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ്. 41/2021 (ചൊവ്വാഴ്ച) തീയതി: 25.05.2021
അടുത്ത 5 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	29.05.2021	30.05.2021
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ)	12	4	6	8	15
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	26	26	26	26	26
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	84	84	84	84	84
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	65	65	65	65	65
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	7	6	10	10	10
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	230	200	230	230	200
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	6	4	2	3	6

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചാറ്റൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത . കൂടിയ താപനില 34°C വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 26°C വരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ: രോഗങ്ങളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആക്രമണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കാലവർഷത്തിനു മുൻപ് തന്നെ കളകളും ഉണങ്ങിയതും രോഗം ബാധിച്ചതുമായ ചെടികളും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ		
വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	നടീൽ രീതികൾ	<p>വിത്ത് വഴിയാണ് തെങ്ങിന്റെ പ്രജനനം മേയ് -ജൂൺ മാസങ്ങൾ ആണ് നടീലിനു അനുയോജ്യമായ സമയം .താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മൺസൂണിന്റെ ശക്തികുറഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നടീൽ നടത്താവുന്നതാണ് .</p> <p>20 വർഷത്തോളം പ്രായമുള്ളതും വർഷത്തിൽ 80 കായ്കൾ പതിവായി ലഭിക്കുന്നതുമായ മാതൃസസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിത്ത് തേങ്ങ ശേഖരിക്കേണ്ടത് .</p> <p>9 -12 മാസം വരെ പ്രായമെത്തിയ തൈകൾ നടീലിനു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് .ഇവക്കു 6 മുതൽ 8 ഇലകൾ ഉണ്ടാകണം .10 മുതൽ 12 സെ .മീ വരെ കടക്കു വ്യാസം ഉണ്ടാകണം .ഇലകൾ ഒറ്റക്കൊറ്റയായി വരുന്നതും എളുപ്പം കായ്കും എന്നതിന്റെ സൂചന ആണ് .</p> <p>1 *1 *1 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കുഴിയാണ് തെങ്ങിൻ തൈ നാടാൻ എടുക്കേണ്ടത് .ഭൂമിരപ്പിൽ നിന്നും 60 സെ .മീ താഴെവരെ മേൽമണ്ണ് കൊണ്ട് കുഴിനികത്തണം .</p> <p>ചെമ്മണ്ണ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തു കുഴിയൊന്നിന് 2 കിലോ കറിയുപ്പ് ചേർക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ</p>

		<p>വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും .നടുന്നതിനു 6 മാസം മുൻപ് കറിയുപ്പ് ചേർക്കണം</p> <p>ജൈവവളം 25 കിലോ തെങ്ങൊന്നിന് എന്ന ക്രമത്തിൽ നടീൽ സമയത്തു ചേർക്കണം</p> <p>താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെറിയ കുഴികൾ എടുത്ത് തൈ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചു പൂഴിയും മണ്ണും ഇട്ട് തൈയുടെ കട നികത്തി ഭൂമിരപ്പു ഉയർത്തികൊണ്ടുവരണം .</p> <p>രണ്ടുവരി ചകിരി കുഴിയിൽ നിരത്തുന്നത് ഇൗർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും .ചകിരി തൊണ്ടിന്റേ വളഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം കമഴ്ത്തിയാണ് വെക്കേണ്ടത് .</p> <p>നടീൽ രീതി അനുസരിച്ചു തെങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 7 .5 മീറ്റർ മുതൽ 9 മീറ്റർ വരെ ക്രമീകരിക്കാം ഒരു ഏക്കറിൽ ഏകദേശം 70 തെങ്ങുകൾ നിലനിർത്താവുന്നതാണ്</p>
<p>നിലക്കടല</p>	<p>നടീൽ രീതികൾ</p>	<p>വിത്തു വഴിയാണ് നിലക്കടലയുടെ പ്രജനനം .പൂർണ്ണവിളക്ക് 40 കിലോ ഒരേക്കറിന് എന്ന തോതിലും ഇടവിളകൾക്കു 16 കിലോ ഒരു ഏക്കറിന് എന്ന തോതിലും വിത്ത് വേണ്ടിവരും .മഴക്കാലവിളക്ക് മേയ് -ജൂൺ മാസമാണ് ഉത്തമം.</p> <p>വിത്തിനായുള്ള നിലക്കടലയുടെ തോട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ വിതയ്ക്കു ഒരാഴ്ച മുൻപ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം .കൈകൊണ്ടു പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുരുവിനു അധികം പരിക്ക് പറ്റുകയില്ല .ചുളുങ്ങിയതും തീരെച്ചെറുത്തും രോഗബാധഏറ്റവും ആയ കുരുക്കൾ ഒഴിവാക്കണം .</p> <p>റൈസോബിയം മിശ്രിതം വിത്തിൽ കലർത്തുന്നത് വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും .ഒരു ഏക്കറിന് 200 ഗ്രാം റൈസോബിയം മതിയാകും .റൈസോബിയം വിത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് കഞ്ഞി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം .കൃഷിയിടം നല്ലവണ്ണം ഉഴുത് നിലമൊരുക്കണം .ആഴത്തിൽ ഉഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കണം .കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് 1 മുതൽ 3 കിലോ ഒരു സെന്റിന് എന്ന തോതിൽ മണ്ണിന്റേ അജ്യാംശത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് .അതിനുശേഷം ഒരു സെന്റിന് 80 കിലോ എന്ന അളവിൽ ജൈവവളം ചേർക്കണം .ഉഴവുചാലിൽ 15 *15 സെ .മീ അകലത്തിൽ നിലകടലകുരുക്കൾ പാകണം .നടീൽ സമയത്തു അടിവളം ചേർത്തു കൊടുക്കണം</p>
<p>കരുമുളക്</p>	<p>ദ്രുതവാട്ടം</p>	<p>ദ്രുതവാട്ടം തടയുന്നതിനായി ചാണകവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ട്രൈക്കോഡർമ ഒരു മുടിന് 5 kg എന്ന കണക്കിൽ തടത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക</p>
<p>വെള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകൾ</p>	<p>കായീച്ച</p>	<p>വെള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകളിലെ കായീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്വലൂർ ഫിറമോൺ കെണി 15 സെന്റിന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ വച്ച് കൊടുക്കുക.</p>

